

Класс XI

«Болезни органов пищеварения» (K00-K93)

**В блоке K00–K14
«Болезни полости рта, слюнных желез и
челюстей»**

**Рубрики, относящиеся к болезням зубов
в статистике заболеваемости не используются**

**Рубрики K25–K28
имеют общие 4–хзначные подрубрики**

Рубрика К35 в редакции обновлений ВОЗ:

К35 Острый аппендицит

К35.2 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом
Аппендицит (острый) с генерализованным (разлитым) перитонитом, вызванный разрывом или прободением

К35.3 Острый аппендицит с ограниченным перитонитом
Острый аппендицит (с или без прободения или разрыва) с перитонитом:

– БДУ

– ограниченным

Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом

К35.8 Острый аппендицит другой и неуточненный

Острый аппендицит без упоминания об ограниченном или генерализованном перитоните

Рубрика K85 в редакции обновлений ВОЗ:

K85 Острый панкреатит

Абсцесс поджелудочной железы

Некроз поджелудочной железы:

- острый
- инфекционный

Панкреатит:

- БДУ
- острый (рецидивирующий)
- геморрагический
- подострый
- гнойный

K85.0 Острый идиопатический панкреатит

K85.1 Острый билиарный панкреатит

Желчнокаменный панкреатит

K85.2 Острый панкреатит алкогольной этиологии

K85.3 Острый панкреатит лекарственной этиологии

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (глава XX)

K85.8 Другой острый панкреатит

K85.9 Острый панкреатит неуточненный

Мезентериотромбоз (K55.0) –
следует помнить, что эта рубрика не всегда
выбирается
в качестве первоначальной причины смерти.
При сочетании с инфарктом мозга и системными
заболеваниями соединительной ткани
первоначальной
причиной смерти выбираются эти заболевания.

Рубрика K91 в статистике смертности не
применяется

**Обновлениями ВОЗ
введена новая рубрика –**

**К64 «Геморрой и перианальный
венозный тромбоз»**

**(Исключена соответствующая рубрика –
I84 из класса
«Болезни системы кровообращения»**

Класс XII

«Болезни кожи и подкожной клетчатки» (L00-L99)

Некоторые инфекции кожи могут являться первоначальной причиной смерти и осложняться сепсисом

Инфекции кожи могут являться осложнением, например, сахарного диабета

L03 Cellulitis Целлюлит

**L03 Флегмона
включен:
острый лимфангит**

**L51.2 Токсический эпидермальный
некролиз [Лайелла]**

Класс XIII

«Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (M00-M99)

M05–M06 «Ревматоидные артриты»

19. Причины смерти	Приблизитель-ный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Хроническая почечная недостаточность</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	1 мес.	N	1	8	.	9
б) <u>Вторичный амилоидоз</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	6 мес.	E	8	5	.	3
в) <u>Серопозитивный ревматоидный артрит с системным поражением</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	<u>M</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	:	<u>3</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Аутоиммунный тиреоидит Идиопатический остеопороз	8 лет 10 лет	E06.3 M81.5				

Системные поражения соединительной ткани М30–М36

19. Причины смерти	Приблизитель-ный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Острый перитонит</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	1 сут.	К	6	5	.	0
б) <u>Мезентериотромбоз</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 сут.	К	5	5	.	0
в) <u>Синдром Такаясу</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	<u>М</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	:	<u>4</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Сахарный диабет II типа с нарушениями периферического кровообращения	7 лет	E11.5				

M80–M81 «Остеопорозы»

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Гипостатическая пневмония</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	5 дней	J	1	8	.	2
б) <u>Патологический перелом шейки левого бедра</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 нед.	M	8	4	.	4
в) <u>Идиопатический остеопороз с патологическим переломом</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	10 лет	M	8	0	.	5
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Постинфарктный кардиосклероз	15 лет	I25.8				

Класс XIV

«Болезни мочеполовой системы» (N00-N99)

**Для рубрик N00–N07
используют общие
4–значные подрубрики**

Рубрика N18 изменена обновлениями ВОЗ:

N18 Хроническая болезнь почки

Если необходимо определить основное заболевание, используют дополнительный код

Если необходимо определить наличие артериальной гипертензии, используют дополнительный код

N18.1 Хроническая болезнь почки, стадия 1

Поражение почки с нормальной или повышенной СКФ [GFR]

(≥ 90

мл/мин)

N18.2 Хроническая болезнь почки, стадия 2

Поражение почки с легким снижением СКФ [GFR]

(60-89

мл/мин)

N18.3 Хроническая болезнь почки, стадия 3

Поражение почки с умеренным снижением СКФ [GFR]

(30-59

мл/мин)

N18.4 Хроническая болезнь почки, стадия 4

Поражение почки со значительным снижением СКФ [GFR]

(15-29

мл/мин)

N18.5 Хроническая болезнь почки, стадия 5

Хроническая уремия

Конечная стадия болезни почки:

- при отмирании аллотрансплантата
- БДУ
- при диализе
- без диализа или трансплантации

Почечный ретинит † (H32.8*)

Уремическая (ий):

- апоплексия † (I68.8*)
- деменция † (F02.8*)
- невропатия † (G63.8*)
- паралич † (G99.8*)
- перикардит † (I32.8*)

N18.9 Хроническая болезнь почки неуточненная

**Рубрики, касающиеся болезней женской
мочеполовой
системы, используются в качестве причин смерти
только
при отсутствии беременности или спустя один год
после окончания беременности**