

«Цереброваскулярные болезни» (I60-I69).

Термин «ЦВЗ» («Цереброваскулярные заболевания») является сборным понятием, включающим в себя различные нозологические единицы, в связи с чем **не используется в качестве диагноза.**

Использование при формулировке диагноза сборных понятий (с расшифровкой нескольких нозологических единиц или без их расшифровки) **недопустимо.**

- Диагноз «энцефалопатия»**
кодируется в соответствии с МКБ-10 (том 3, стр.688):
- в классе VI «Болезни нервной системы»:
 - Алкогольная энцефалопатия – G31.2;**
 - Токсическая энцефалопатия – G92;**
 - Энцефалопатия неуточненная – G93.4.**
 - в классе IX «Болезни системы кровообращения»:
 - Атеросклеротическая энцефалопатия – I67.2;**
 - Гипертензивная энцефалопатия – I67.4.**

Диагноз **«Дисциркуляторная энцефалопатия»** в МКБ-10 не определен в качестве самостоятельной нозологической единицы и должен кодироваться как «энцефалопатия» – код G93.4 (том 3, стр. 688).

Если «Дисциркуляторная энцефалопатия» употребляется как синоним «Хронической ишемии мозга», то в соответствии с МКБ-10 следует применять термин **«Хроническая ишемия мозга»**, код I67.8.

Диагноз «Инсульт»

в соответствии с МКБ-10, обозначает острое нарушение мозгового кровообращения, не уточненное как кровоизлияние или инфаркт. Вид нарушения мозгового кровообращения должен быть уточнен.

Не следует использовать устаревшие термины, отсутствующие в МКБ-10, такие как, например, ишемический инсульт.

Вместо него следует использовать современный термин, принятый в международной практике – **инфаркт мозга**.

Острые цереброваскулярные болезни (I60-I66)

Диагнозы кровоизлияний, инфарктов, инсультов, закупорок и стенозов сосудов мозга устанавливаются до 30 дней от начала заболевания в пределах эпизода оказания медицинской помощи, а при стационарном эпизоде – независимо от продолжительности госпитализации.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга _____ <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	25 мин	G	9	3	.	5
б) отек мозга _____ <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 час	G	9	3	.	6
в) Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии _____ <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 дня	I	6	0	.	1
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Гипертензивная болезнь сердца с сердечной недостаточностью Атеросклеротический кардиосклероз	1 год 15 лет	I11.0 I25.1				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	4 час.	G	9	3	.	6
б) <u>внутри мозговое кровоизлияние внутрижелудочковое</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	6 час.	I	6	1	.	5
в) <u>Разрыв ягодоподобной аневризмы головного мозга</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	8 час.	I	6	0	:	7
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия	4 года	I10.X				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	15 мин	G	9	3	.	5
б) обструктивная гидроцефалия <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 час	G	9	1	.	1
в) Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 дня	I	6	1	:	5
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Атеросклеротический кардиосклероз Артериальная гипертензия	15 лет 1 год	I25.1 I10.X				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) паралич дыхательного центра _____ болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	15 мин	G	9	3	.	8
б) сдавление мозга _____ патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	1 час	G	9	3	.	5
в) Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга _____ первоначальная причина смерти указывается последней	8 час.	I	6	1	:	3
г) _____ _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия	3 года	I10.X				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	10 мин	G	9	3	.	5
б) отек мозга патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	40 мин.	G	9	1	.	6
в) Внутримозговое кровоизлияние множественное первоначальная причина смерти указывается последней	1 сут.	I	6	1	:	6
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий Артериальная гипертензия	1 сут. 3 года	I63.4 I10.X				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>сепсис, вызванный неуточненным стафилококком</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	10 час.	A	4	1	.	2
б) <u>бактериальный менингоэнцефалит</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 сут.	G	0	4	.	2
в) <u>Внутри мозговое кровоизлияние цереброменингеальное</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 сут.	I	6	1	:	8
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия Атеросклеротический кардиосклероз	3 года 7 лет	I10.X I25.1				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	1 час	G	9	3	.	6
б) <u>внутри мозговое кровоизлияние субкортикальное</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 сут.	I	6	1	.	0
в) <u>Гипертензивная болезнь с поражением сердца с сердечной недостаточностью</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 года	I	1	1	:	0
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический холецистит	6 лет	K81.1				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	25 мин	G	9	3	.	5
б) внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 сут.	I	6	1	.	1
в) Гипертензивная энцефалопатия <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 года	I	6	7	:	4
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия Атеросклеротический кардиосклероз	5 лет 10 лет	I10.X I25.1				

19. Причины смерти	Приблизитель-ный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
Г а) стрептококковый сепсис <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	10 мин.	A	4	0	.	9
б) гипостатическая пневмония <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	8 час.	J	1	8	.	2
в) Инфаркт мозга, вызванный закупоркой мозговых артерий <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	10 дней	I	6	3	:	5
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия Цирроз печени	7 лет 5 лет	I10.X K74.6				

В случае смерти от острых форм цереброваскулярных болезней следует помнить, что **не все эти случаи** выбираются в качестве первоначальной причины смерти:

при сочетании острых форм цереброваскулярных болезней со злокачественным новообразованием, сахарным диабетом или бронхиальной астмой первоначальной причиной смерти считают эти заболевания, а острые формы цереброваскулярных болезней – их осложнениями (МКБ-10, т. 2, стр. 75),
данные сочетания должны быть правильно отражены в заключительном посмертном диагнозе, промежуток времени сохраняется – не позднее 30 дней от начала возникновения заболевания или в пределах эпизода оказания медицинской помощи.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	6 час.	I	6	3	.	3
б) <u>Нефропатия</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 года	N	2	8	.	9
в) <u>Сахарный диабет I типа с множественными осложнениями</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	5 лет	E	1	0	:	7
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический обструктивный бронхит Атеросклеротический кардиосклероз	10 лет 20 лет	J44.8 I25.1				

При сочетании острых форм цереброваскулярных болезней с тяжелыми системными заболеваниями соединительной ткани первоначальной причиной смерти следует считать системные заболевания, а острые нарушения мозгового кровообращения – их осложнениями.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) Отек мозга <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	3 час.	G	9	3	.	6
б) Внутримозговое кровоизлияние кортикальное <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 сут.	I	6	1	.	1
в) Узелковый полиартериит <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	M	3	0	:	0
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический обструктивный бронхит	7 лет	J44.8				

в остальных случаях первоначальной причиной смерти следует считать острые формы цереброваскулярных болезней (коды I60-I64) в промежуток времени до 30 дней или в пределах эпизода оказания медицинской помощи (даже, если он закончился позже); коды I65 и I66 в качестве первоначальной причины смерти не применяются, в случае смерти необходимо использовать код I63 (МКБ-10, т. 2, стр. 62); при сочетании острых форм цереброваскулярных болезней с эссенциальной гипертензией (код I10), приоритет при выборе первоначальной причины смерти всегда отдается **острым** формам цереброваскулярных болезней (МКБ-10, т. 2, стр. 59);

При сочетании острых форм цереброваскулярных болезней с другими болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением (коды I11-I13), выбор первоначальной причины смерти производится в соответствии с «Общим принципом», в соответствии с которым, при правильно записанной логической последовательности, когда состояние на строке ниже является причиной возникновения состояния, расположенного на строке выше, первоначальная причина смерти всегда будет находиться на самой нижней строке части I Свидетельства;

Хронические формы цереброваскулярных болезней (I67).

Хронические формы цереброваскулярных болезней могут являться первоначальной причиной смерти только в случаях присоединения тяжелых осложнений, как, например, пневмонии. Такая логическая последовательность должна быть обязательно указана в Свидетельстве. Не допускается запись хронической формы цереброваскулярных болезней одной строкой без указания логической последовательности.


19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) гипостатическая пневмония _____ болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	2 мес.	J	1	8	.	2
б) подкорковая сосудистая деменция _____ патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	2 года	F	0	1	.	2
в) Хроническая ишемия мозга _____ первоначальная причина смерти указывается последней	4 года	I	6	7	.	8
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия	5 лет	I10.X				

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>сепсис стафилококковый</u> болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	2 сут.	A	4	1	.	2
б) <u>гипостатическая пневмония</u> патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	3 нед.	J	1	8	.	2
в) <u>Хроническая ишемия мозга</u> первоначальная причина смерти указывается последней	5 лет	I	6	7	:	8
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Атеросклеротический кардиосклероз	7 лет	I25.1				


19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
а) гипостатическая пневмония <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	2 нед.	J	1	8	.	2
б) сосудистый паркинсонизм <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	3 года	G	2	1	.	4
в) Церебральный атеросклероз <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	8 лет	I	6	7	.	2
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Атеросклеротический кардиосклероз	7 лет	I25.1				

При хронических формах цереброваскулярных болезней первоначальной причиной смерти могут являться другие состояния, обозначенные в рубриках конкретных неврологических расстройств из класса VI «Болезни нервной системы», например, «Боковой амиотрофический склероз» (G12.2), «Болезнь Альцгеймера» (G30), «Рассеянный склероз» (G35) и др.

Хронические формы цереброваскулярных болезней в этих случаях записывают в части II Свидетельства.



Если при наличии у пациента с хронической ишемией мозга возникло обострение заболевания – острая форма цереброваскулярного заболевания, то в качестве основного состояния записывают острую форму, как более тяжелую (правило МВ1, МКБ-10, том 2, стр. 118), которую, в случае смерти выбирают в качестве первоначальной причины смерти, а хроническую ишемию мозга записывают в части II Свидетельства.



«Последствия цереброваскулярных болезней» (I69) –
эта рубрика используется только для регистрации летальных
исходов и не используется для обозначения
хронических цереброваскулярных болезней.

Логическая последовательность должна быть
обязательно указана в Свидетельстве.

Не допускается запись
последствий цереброваскулярных болезней
одной строкой без указания логической
последовательности.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
Г а) сдавление мозга болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	5 мин.	G	9	3	.	5
б) обструктивная гидроцефалия патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	10 час.	G	9	1	.	1
в) Последствия субарахноидального кровоизлияния первоначальная причина смерти указывается последней	2 года	I	6	9	:	0
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия	6 лет	I10.X				

19. Причины смерти	Приблизитель-ный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга _____ болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	20 мин.	G	9	3	.	5
б) внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга _____ патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	3 час.	I	6	1	.	3
в) Последствия внутримозгового кровоизлияния _____ первоначальная причина смерти указывается последней	2 года	I	6	9	:	1
г) _____ _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия	3 года	I10.X				

Сочетания цереброваскулярных болезней с другими заболеваниями

Сахарный диабет, бронхиальная астма, злокачественное новообразование

При сочетании сахарного диабета, бронхиальной астмы или злокачественного новообразования с острыми цереброваскулярными болезнями (I60-I64) в качестве первоначальной причины смерти должны быть выбраны сахарный диабет, бронхиальная астма или злокачественное новообразование.

Эти заболевания должны быть записаны в части I Свидетельства; острые формы цереброваскулярных болезней записывают там же, как осложнения этих болезней – в логической последовательности.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	4 час.	G	9	3	.	6
б) <u>Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 нед.	I	6	3	.	3
в) <u>Бронхиальная астма аллергическая</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	6 лет	J	4	5	.	0
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический обструктивный бронхит Атеросклеротический кардиосклероз	8 лет 10 лет	J44.8 I25.1				

Сосудистая деменция

Если у пациентов, страдающих острыми или хроническими цереброваскулярными заболеваниями, выявлена деменция (F01, F03), то в случае смерти пациента первоначальной причиной смерти считается сосудистая деменция, код F01.

Консультация специалиста для подтверждения деменции обязательна.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Подкорковая сосудистая деменция</u> болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	2 мес.	F	0	1	:	2
б) <u>Хроническая ишемия мозга</u> патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	2 года	I	6	7	.	8
в) _____ первоначальная причина смерти указывается последней						
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)						
Церебральный атеросклероз	4 года	I67.2				
Артериальная гипертензия	5 лет	I10.X				

При сочетании болезни Паркинсона с острыми цереброваскулярными заболеваниями:

- с внутримозговыми кровоизлияниями – первоначальной причиной смерти считается Болезнь Паркинсона.

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	3 час.	G	9	3	.	6
б) <u>Внутримозговое кровоизлияние кортикальное</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 сут.	I	6	1	.	1
в) <u>Болезнь Паркинсона</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	6 лет	<u>G</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>X</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия Атеросклеротический кардиосклероз	2 года 15 лет	I10.X I25.1				

В случаях смерти:

- При сочетании болезни Паркинсона с **инфарктами мозга (I63)** в качестве первоначальной причины смерти выбирают **инфаркт мозга**, а болезнь Паркинсона записывают в части II свидетельства о смерти.
- При сочетании **болезни Паркинсона с нарушениями сердечного ритма, пневмонией, заболеваниями мочевой системы** в качестве первоначальной причины смерти выбирают **болезнь Паркинсона (G20)**

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Уремия</u> болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	3 сут.	N	1	9	.	X
б) <u>Хронический пиелонефрит</u> патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	2 года	N	1	1	.	9
в) <u>Болезнь Паркинсона</u> первоначальная причина смерти указывается последней	5 лет	<u>G</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>X</u>
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Артериальная гипертензия Постинфарктный кардиосклероз	4 года 10 лет	I10.X I25.8				

«Болезни артерий, артериол и капилляров» (I70-I79)

«Атеросклероз» (I70)

Сборные понятия (термины), такие как «общий атеросклероз», «генерализованный атеросклероз» в качестве диагноза основного заболевания и в качестве первоначальной причины смерти **не используются**. Следует использовать только рубрики, обозначающие атеросклеротическое поражение конкретных сосудов, например, «атеросклероз аорты», «атеросклероз сосудов нижних конечностей с гангреной».

**В рубрику I72 добавлена новая подрубрика:
I72.6 «Аневризма и расслоение позвоночной артерии».**

**С 2013 года рубрика I84 «Геморрой» исключена
из класса IX «Болезни системы кровообращения»
и перенесена в класс XI
«Болезни органов пищеварения» (рубрика K64).**

**Это изменение существенно повлияет на статистику
заболеваемости, так как приведет к уменьшению
показателя заболеваемости по классу IX
«Болезни системы кровообращения» и
увеличению заболеваемости по классу XI
«Болезни органов пищеварения».**

**На статистике смертности это изменение
практически не отразится, так как «Геморрой»
редко выбирается в качестве первоначальной причины смерти.**

Класс X «Болезни органов дыхания»

**Диагноз «острый бронхит» кодируется в зависимости от возраста.
В рубрику J20 входят диагнозы:**

- «острый бронхит», «подострый бронхит» и «бронхит» у лиц до 15 лет;**
- «острый бронхит» и «подострый бронхит» у взрослых.**

В рубрику J40 входит диагноз «бронхит» у лиц старше 15 лет.

Для диагноза «хронический бронхит» для всех возрастов предусмотрена рубрика J42.

Введены новые рубрики и подрубрики

J09	Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа
J12.3	Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека
J21.1	Острый бронхолит, вызванный метапневмовирусом человека

В рубрику J09 включаются:

- грипп A/H1N1 «свиной грипп»
- грипп A/H5N1 «птичий грипп»

Если J44.8-9 сочетаются с пневмониями J12-J18 первоначальной причиной смерти считают J44.0